

# ИНСУЛЬТ

это скоротечное нарушение функций головного мозга из-за нарушений в его кровоснабжении.

Инсульт является серьезнейшим заболеванием, требующим неотложной медицинской помощи. **3-6 часов – если в течение этого времени не будет оказана помощь, пострадавшему грозит глубокая инвалидность и даже смерть.**



## Симптомы заболевания:

	слабость, паралич (неспособность двигаться) или онемение лица или конечностей на одной стороне тела		резкое ухудшение зрения, размытие изображения, особенно на один глаз		неожиданные затруднения речи, невнятная речь, западающий язык, отклонение языка в одну сторону		неожиданные трудности в понимании речи
	внезапные затруднения глотания		необъяснимые падения, головокружение или потеря равновесия		внезапная сильная (самая сильная в жизни) головная боль или новый необычный характер головной боли без определенной причины		сонливость, спутанность сознания или потеря сознания

**ВНИМАНИЕ:** если человек не употреблял алкоголь, но ведет себя "как пьяный" - данный симптом может говорить о развитии инсульта. Наличие алкогольного опьянения также не исключает развитие инсульта. Внимательнее относитесь к людям, которые выглядят "как пьяные" - возможно вы сможете спасти чью-то жизнь!

### Попросите больного УЛЫБНУТЬСЯ



**Норма:** Обе стороны лица движутся и выглядят симметрично

**Инсульт:** Лицо не симметрично, одна сторона лица движется при улыбке с отставанием, заметно "провисание" щеки, угол рта, века с одной стороны.

### Попросите больного ПОДНЯТЬ РУКИ и подержать перед собой 10 секунд



**Норма:** Движение и положение рук одновременно и симметрично

**Инсульт:** Одна рука отстает от другой, либо не движется или почти не движется.

### Попросите больного ПОВТОРИТЬ ФРАЗУ: "Несла Саша сушки по шоссе"



**Норма:** Речь отчетливая, - повтор фразы точен

**Инсульт:** Речь невнятная, повтор фразы неполный, либо невозможность речи

## Что нужно сделать до приезда врача



1 Больного необходимо уложить, положив ему под голову, плечи и лопатки подушку, так чтобы голова составляла угол примерно 30° к кровати, полу, скамейке...



2 Обеспечьте доступ свежего воздуха, для этого снимите стесняющую одежду, расстегните воротничок рубашки, откройте окно, если есть кондиционер – включите. Уберите съемные зубные протезы.



3 Если есть рвота, поверните голову набок, оберните руку чистым платком или марлей и очистите полость рта от рвотных масс. Заброс их в дыхательные пути грозит тяжелейшей формой пневмонии, с которой потом будет сложно бороться.



4 Обязательно измерьте артериальное давление. Раньше считали: если оно повышенено, надо снижать до 120/80 мм рт. ст. Резкое снижение давления не менее опасно, чем его высокие значения! Обычно человек знает свои "рабочие" цифры. Надо ориентироваться на цифры, превышающие "рабочие" на 5-10 мм рт. ст., и давать гипотензивный препарат (лучше тот, к которому пострадавший привык, пользуется в повседневной жизни).